

<Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede obtenerse sin receta, para el tratamiento de afecciones menores sin la intervención de un médico. No obstante, debe usted utilizar con cuidado **Tantum 3% pomada** para obtener los mejores resultados.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita información adicional o consejo, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten después de 7 días, debe consultar a un médico. >

Tantum 3% pomada **BENCIDAMINA**

En este prospecto se explica:

1. Qué es **Tantum 3% pomada** y para qué se utiliza
2. Antes de usar **Tantum 3% pomada**
3. Cómo usar **Tantum 3% pomada**
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de **Tantum 3% pomada**

El principio activo es bencidamina hidrocloreto. 100 gramos de pomada contienen 3 gramos de este principio activo. Los demás componentes son: alcohol cetílico, vaselina filante, sorbitom SE, sorbitom TE, propilenglicol y agua purificada.

Titular: ANGELINI FARMACÉUTICA, S.A.
C. Osi, 7 - 08034 Barcelona (España)

Fabricado por: ACRAF S.p.A.
Via Vecchia del Pinocchio, 22
60131 Ancona (Italia)

1. QUE ES Tantum 3% pomada Y PARA QUE SE UTILIZA

Tantum 3% pomada se presenta en forma de pomada en tubos de 50 g para aplicación tópica dermatológica (sobre la piel).

Tantum 3% pomada es un medicamento con actividad analgésica de uso externo.

Este medicamento está indicado para el alivio local sintomático de los dolores musculares y articulares provocados por: contusiones, golpes, torceduras, distensiones, contracturas, esguinces y lumbago

2. ANTES DE USAR Tantum 3% pomada

No use Tantum 3% pomada en los siguientes casos:

- Alergia a la bencidamina, al ácido acetilsalicílico, a otros analgésicos o antiinflamatorios o a cualquiera de los componentes de esta especialidad.

- Sobre heridas, mucosas o piel eczematosa.

Tenga especial cuidado con Tantum 3% pomada ya que:

- Es de uso externo y por ello no se debe ingerir.
- Sólo debe utilizarse en piel intacta.
- Debe evitarse el contacto con los ojos.
- Debe evitarse aplicar calor ó vendajes apretados o que no permitan la aireación de la zona a tratar.
- Debe evitarse utilizar de forma prolongada ni en áreas extensas.
- Debe evitarse aplicar simultáneamente en la misma zona que otras preparaciones tópicas.
- Debe evitarse exponer al sol la zona tratada.
- Si los síntomas empeoran o duran más de 7 días o aparece irritación debe usted interrumpir el tratamiento y consultar al médico.

Embarazo y lactancia:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento si usted está embarazada o sospecha que pudiera estarlo.

Importante para la mujer

Si está embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o para el feto, y debe ser vigilado por su médico.

Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica.

No se han descrito interacciones, pero no debe utilizarse con otros analgésicos o antiinflamatorios en la misma zona, sin consultar previamente con su médico.

Uso en niños

No utilizar en niños menores de 12 años.

3. CÓMO USAR Tantum 3% pomada

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras instrucciones distintas.

Adultos y niños mayores de 12 años: aplicar una fina capa del preparado en la zona dolorida 3 ó 4 veces al día. El producto debe aplicarse mediante un ligero masaje para facilitar la penetración y absorción y lavarse las manos después de cada aplicación.

Si usted usa más Tantum 3% pomada del que debiera:

Debido a su uso externo, no es probable que se produzcan cuadros de intoxicación. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir inmediatamente a un centro médico o consultar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20, indicando el producto y la cantidad ingerida.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, Tantum 3% pomada puede tener efectos adversos.

Ocasionalmente pueden producirse reacciones de fotosensibilidad (sensibilidad a la luz solar en la zona afectada), enrojecimiento, inflamación de la piel (dermatitis), irritación local, picor en el punto de aplicación, que desaparecen al suspender el tratamiento.

Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE Tantum 3% pomada

No conservar a temperatura superior a 25°C. Conservar protegido de la humedad.

Mantenga **Tantum 3% pomada** fuera del alcance y de la vista de los niños.

Caducidad

No utilizar el medicamento después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Este prospecto ha sido aprobado marzo 2002