

**Actividad:** Antiséptico Bucofaríngeo.  
**Indicaciones:** Alivio sintomático de las infecciones bucales leves como: aftas y pequeñas úlceras. Mal aliento. Afonías y ronqueras. **Contraindicaciones:** Intolerancia al yodo o sus derivados. No usar en niños menores de 30 meses.  
**Precauciones:** No ingerir. Evitar contacto con ojos y oídos. Consulte a su médico si los síntomas persisten, se agravan o aparece fiebre.  
**Interacciones:** No utilizar con derivados mercuriales ni con productos a base de litio. **Advertencias:**  
**Embarazo y lactancia:** Evítese su uso continuado. **Efectos sobre la capacidad de conducción:** No se han descrito. **Posología e instrucciones de empleo:** Adultos y niños mayores de 6 años: como gargarismos o en enjuagues de boca. Después de limpiarse los dientes, diluir un tapón raso de producto en medio vaso de agua. Repetir 2 ó 3 veces al día. **Sobredosis:** En caso de ingestión accidental, acudir a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, tfno: (91)5620420, indicando el producto y la cantidad ingerida. **Reacciones adversas:** En los raros casos en los que se produzca irritación o alergia, suspender el tratamiento y lavar la zona afectada con agua. Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente consulte con su médico o farmacéutico. **Caducidad:** Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase. **Texto revisado:** Junio 2006.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS SIN RECETA MÉDICA 09468.6**

997452.7-EFP

**Betadine®**

**BUCAL**

Povidona iodada 125 ml  
solución concentrada

VIA GINGIVAL NO INGERIR

Composición por 100 ml: Povidona iodada 10 g, glicerol, aroma de menta, sacarina sódica 0,2 g, hidróxido sódico, agua, c.s.

**MEDA**

Pharma SAU  
Av. Castilla, 2 (P.E. San Fernando)  
28830 S. Fdo. De Henares (Madrid)  
Fabricante: Meda Manufacturing,  
Burdeos (Francia)  
Licencia MUNDIPHARMA AG. Suiza